



A

C

N

É



**MENOR POTENCIAL
DE IRRITACIÓN**

C

N

É



**MENOR POTENCIAL
DE IRRITACIÓN**



**MAYOR ADHERENCIA
AL TRATAMIENTO**

N

É



**MENOR POTENCIAL
DE IRRITACIÓN**



**MAYOR ADHERENCIA
AL TRATAMIENTO**



ACCIÓN MÁS RÁPIDA

É



**MENOR POTENCIAL
DE IRRITACIÓN**




**MAYOR ADHERENCIA
AL TRATAMIENTO**



ACCIÓN MÁS RÁPIDA



**MAYOR ECONOMÍA
DE TRATAMIENTO**



El uso de las **combinaciones fijas** para el tratamiento del acné facilita un abordaje terapéutico **más simple, eficaz y completo** que con asociaciones o monoterapia.

Las combinaciones fijas **facilitan la adherencia** de los pacientes al tratamiento, factor clave para un **efectivo control del acné**.

Las combinaciones fijas ofrecen **más beneficios** frente a las asociaciones³

3. G Wbster Evidence-Based Review: Fixed-Combination Therapy and Topical Retinoids in the Treatment of Acneh. J Drugs Dermatol. 2011;10(6):636-644.

CLINDACUR UNO

ADAPNÉ DÚO

LENEMICINA



El uso de las **combinaciones fijas** para el tratamiento del acné facilita un abordaje terapéutico **más simple, eficaz y completo** que con asociaciones o monoterapia.

Las combinaciones fijas **facilitan la adherencia** de los pacientes al tratamiento, factor clave para un **efectivo control del acné**.

Las combinaciones fijas ofrecen **más beneficios** frente a las asociaciones³

3. G Wbster Evidence-Based Review: Fixed-Combination Therapy and Topical Retinoids in the Treatment of Acneh. J Drugs Dermatol. 2011;10(6):636-644.

CLINDACUR UNO

ADAPNÉ DÚO

LENEMICINA



Salud y belleza en la piel

CLINDACUR UNO

**Control del acné inflamatorio leve y moderado
sin riesgo de resistencia bacteriana.**

Clindamicina 1% - Peróxido de Benzoilo 5%

- **Actúa rápidamente** frente al P.acnes reduciendo las lesiones inflamatorias
- **Mejoras significativas** desde la primera semana de tratamiento
- **Mejora** el perfil de tolerancia al PBO
- Combinación fija que **demostró no inducir resistencia bacteriana**.^{1,2}
- **Clindacur Uno no requiere** conservación en heladera, una vez comenzado el tratamiento.
- Por su única aplicación diaria **facilita la adherencia** del paciente al tratamiento.

Presentación para su prescripción:
Clindacur Uno Gel
Pomo de 30 gramos.



1. Cunliffe, WJ; Holland KT, Bojar R y Levy SF. A randomized, double-blind comparison of a Clindamycin phosphate/Benzoyl Peroxide gel formulation and a matching clindamycin gel with respect to microbiologic activity and clinical efficacy in the topical treatment of acne vulgaris. *Clinical Therapeutics* 2002; 24: 1117-33. 2. Leyden J, Levy S. The Development of Antibiotic Resistance in Propionibacterium acnes. *Cutis* 2001; 67: 21-24.

VOLVER

ADAPNÉ DÚO

LENEMICINA



Salud y belleza en la piel

ADAPNE DUO

Adapalene 0,1% - Peróxido de Benzoilo 2,5%

Rapidez y efectividad en el tratamiento del acné comedoniano y pápulo pustuloso leve

ADAPNE DUO Forte

Adapalene 0,3% - Peróxido de Benzoilo 2,5%

Rapidez y efectividad en el tratamiento del acné comedoniano y pápulo pustuloso moderado y grave

Presentación:

Adapné Dúo Gel
Pomo por 30 gramos.



- 1 vez al día por la noche.
- Más eficaz que sus componentes por separado en la reducción de lesiones.
- Mejoría clínica desde la 1º semana.
- Acción comedolítica y anticomedogénica.
- Acción antiinflamatoria y antibacteriana
- El perfil de seguridad de Adapné Duo Forte es similar al de Adapné Duo.

NUEVO

Presentación:

Adapné Duo Forte
Gel en Bomba
Dosificadora por
30 gramos.



VOLVER

CLINDACUR UNO

LENEMICINA



Salud y belleza en la piel

LENEMICINA

Primera combinación fija de Adapalene y Clindamicina para tratar con éxito acné pápulo pustuloso leve y moderado.

Adapalene 0,1% - Clindamicina 1%

- Acción terapéutica **comprobada** en 3 de los 4 factores patogénicos del acné:
 - ▶ Alteración del proceso de **queratinización**
 - ▶ **Colonización** por el P. acnes
 - ▶ **Liberación** de mediadores inflamatorios
- **Mayor penetración** de la clindamicina en el folículo favorecida por el adapalene⁴
- **Lenemicina gel** en el vehículo adecuado para **maximizar la tolerabilidad**
- **Lenemicina** puede indicarse durante **todo el año**



Presentación para su prescripción:
Lenemicina Gel
Pomo de 30 gramos.

⁴ Jain GK, Ahmed FJ. Adapalene pretreatment increases follicular penetration of clindamycin: In vitro and in vivo studies. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2007;73:326-9

VOLVER

CLINDACUR UNO

ADAPNÉ DÚO